+

Monsieur

Le grand Nombre D'accouchements Laborieux Dans les quels Jay Donné Secours aux femmes, Durant une pratique De vingt quatre ans, et ce dans un arrondissement de dix a douze paroisses, m'ayant Donné occasion De faire quelques observations Dont Je pense que cette partie de l'art De guerir, pourroit tirer quelque utilité Si elles Devenoient publiques; Jay cru devoir vous les communiquer.

Les praticiens ont Reconnu que la trop grande Solidité Des Membranes qui enveloppent L'enfant Dans le Sein de Sa mere, etoit cause De la longueur des accouchements; mais comme ils ne donnent aucune difference de ces cas; que le plus ordinaire ne merite aucune consideration entre les mains d'une personne instruite; qu'il n'en est pas ainsi Du Second, qu'il faut Deviner, et auquel même on ne Remedie pas Si facilement; c'est de ce dernier dont Je veux parler: il ne Se Rencontre que dans les accouchements D'enfants Jumeaux; ou ordinairement les membranes Du premier enfant Sont très foibles et Se Dechirent très a bonne heure; et celles du Second enfant Sont quelque fois très Solides; c'est pour lors qu'elles Sont veritablement cause De la longueur De l'accouchement, qui n'a lieu que douze a quinze heures après le premier, et quelque fois plus tard, Si l'accoucheur ne Se Determine D'aller chercher le Second enfant: cette Solidité des membranes S'opposant a la contraction de la matrice, et la Reduisant a une Sorte d'inertie; etat qui arrive encore a ce viscere, lorsque l'arrierefaix Se trouve chattonné en totalité ou en partie.

Lorsque Je commancai a pratiquer Je fus Mandé pour une femme Dont Le travail etoit commancé, Ses eaux ecoulees et Son enfant avoit une Jambe entierement au Dehors; elle etoit au lit, Sans changer Sa position Je l'accouchai avec facilité, (Son enfant vivoit) ayant voulu la delivrer, Je portai Deux doits fort avant Dans le vagin pour assujettir le cordon ombilical et Soutenir L'effort que J'allois faire dessus avec L'autre main; Je Sentis Sur le dos De mes doits quelque chose que Je ne distingois pas; mais changeant De position, et presantant a l'obstacle Leur partie interne, Je Reconnus que c'etoit une poche d'eau que Je jugai De figure conique, dont la pointe Repondoit sous la Simphise Du pubis De la mere; Je portai la main Sur le ventre De la malade, Je connus a Son volume qu'elle etoit enceinte D'un Second enfant; Je cherchai a Dechirer cette poche, la pincent entre l'index et le medius; Je perdis Sept a huit heures a cette tentative, enfin après ce temps, Soit naturellement, Soit par les efforts que J'avois fait, cette poche S'ouvrit et laissa ecouler un peu D'eau: alors Je me decidai a porter la main dans la matrice; mon etonnement fut extrême De m'y trouver très au large, et De n'y point toucher D'enfant; Je mis ma main en Supination, et Je touchai dans la partie laterale Droite et anterieure de la matrice, le coude flechi d'un enfant, Sortant D'une ouverture assés etroite; J'introduisis mes doits, puis la main dans la dite ouverture; J'allai Saisir les pieds de cet enfant, et le tirai au dehors Bien vivant: ma premiere idée fut que cet enfant etoit tombé Dans la capacité du bas ventre par quelque Dechirure arrivée a la matrice; mais Sa Sortie n'etant accompaignée, ni d'hemorragie, ni d'aucune Des parties contenues, Je pensai qu'il avoit eté conçu dans quelque hernie formée par la matrice: Je delivrai la malade Sans aucun examen; Jay demuré Six ans persuadé qu'il y avoit Des hernies De matrice. L'enfant et la mere S'echapperent, elle vit et a accouché depuis très heureusement.

B— Six ans après une femme accoucha Sans etre aidée, on vint le Lendemain me Reclamer pour la delivrer; Je m'y Rendis a onze heures du matin: elle etoit au lit Souffrant très peu; Je portai ma main Sur Son ventre, Je Reconnus a Son volume qu'elle etoit enceinte d'un Second enfant; après les precautions Requises J'introduisis ma main dans la matrice; Je m'y trouvai fort au large, et Je ne touchai D'abord aucun enfant, mais ayant penetré vers Sa partie laterale gauche, Je Sentis au travers D'une menbrane fort epaisse, le corps D'un enfant qui formoit une tumeur Dans Sa cavité; Je

ARC 24 d 3
n° 48
ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Je pinçai avec deux doits cette menbrane, mais ce fut sans succès; Je fus obligé de changer de main, et pour lors l'ayant saisie entre les quatre doits et la paulme de ma main gauche, J'y fis une déchirure d'environ six pouces, a travers de laquelle ayant introduit ma main, je saisis les pieds d'un enfant, et je le tiray au dehors. Je délivrai la malade des deux arrierfaix et les examinai avec attention; ils etoint adossés ensemble; les menbranes de celuy du dernier enfant avoint ~~tout~~ l'épaisseur d'un écu de six livres; elles etoint si solides, qu'il n'i avoit aucune autre ouverture que la déchirure que j'y avois fait, et par la quelle j'avois sorti cet enfant, qui a actuellement dix huit ans et est très robuste, la mere vit et a accouché depuis sans secours.

Le défaut de contraction ou l'inaction de la matrice, se rencontre ordinairement lorsque l'arrier faix se trouve chattonné en totalité ou en partie, ce qui peut donner naissance a des accidents funestes, aux quels on obvieroit, si on avoit connoissance de ces differents cas.

il y a trois ans que je fus mandé pour une femme accouchée dès la veille il luy restoit des tranchees frequentes et une perte assés abondante; l'eloignement ne me permit de la voir qu'a trois heures de l'après midi; j'examinai la malade, je cru que son etat dépendoit de quelque caillot de sang retenu, j'introduisis ma main dans sa matrice, je m'y trouvai fort a l'aise, je touchai dans sa partie laterale droite une portion de menbranes dependantes des envelopes de l'enfant, je voulus les tirer; elles etoint adhérentes a un petit placenta du volume d'un œuf de poule qui etoit enchassé dans la substance de la matrice; je détâchai ce cotyledon de sa capsule et le tirai au dehors joint aux menbranes dont j'ay parlé: de cet instant les accidents cessairent, et la malade se retablit très promptement.

Je fus mandé pour une femme en travail depuis trois jours; je l'accouchai d'une fille ~~robuste; l'arrier faix entièrement sorti,~~ je sentis une resistance que m'opposoit une portion de menbranes, qui de l'arrier faix tenoit a la matrice; je tâchai de les sortir sans les detacher de sa masse; mais leur onctuosité ne me permettant pas une prise suffisante, j'introduisis ma main dans la matrice soutenant de l'autre le placenta; je trouvai que ces menbranes tenoint a une sorte de petit arrier faix, qui y etoit chattonné; je le détâchai de sa capsule, il sortit de suitte tenant au premier, par la portion de menbranes dont j'ay fait mention cy dessus. Les suittes de couches furent heureuses.

une femme ayant accouché, on rompit le cordon près l'arrier faix; je fus mandé pour la délivrer, ayant introduit ma main dans sa matrice avec aisance; je trouvai que partie de l'arrier faix etoit chattonnée dans la substance de la matrice, et que le restant n'y etoit qu'appliqué; je détâchai le tout et je délivrai la malade: la portion de l'arrier faix qui avoit été chattonnée, avoit plus d'épaisseur que l'autre; sa couleur etoit plus foncée, les vidanges furent très fetides, les suittes de couches furent neanmoins heureuses.

une femme sentit des douleurs pour accoucher; elle fit appeler la matrone ses eaux etoint écoulées, et la sage femme ne connoissant pas ce qui se présentoit, demanda du secours; je fus mandé, le cas etoit embarrassant, car on ne touchoit que quelque chose de très irrégulier; c'étoit un visage posé presque horisontalement aux epaules de l'enfant, ayant une figure ovale, dont les bouts alongés etoint l'un a droit, l'autre a gauche, les bords applatis de l'ovale repondoint, l'un au devant de la poitrine, l'autre au dos; son menton applati formoit une ligne droite avec le col, qui etoit très court et inflexible; sa bouche excessivement fendue etoit bordée de lèvres très epaisses et renversées; son nés fort retroussé, les narines très dilatées, ses joues assés saillantes, etoint bornees par des oreilles

d'un volume double a celles d'un enfant de naissance, et touchoint aux epaules; ses yeux etoint assés grands; il ni avoit du coronal que la portion de cet os necessaire pour former le dessus des orbites; le reste manquoit ainsi que les deux parietaux et la plus grande portion de l'occipital: le vide formé par le deffaut de ces parties qui caracterisent un acéphale, etoit présque perpendiculaire a l'épine du dos, et occupé par une substance rougeatre et comme fongeuse de la grosseur d'un œuf de poule, et dans la quelle on observoit des mouvements alternatifs de dilatation et de contraction. J'accouchay cette femme de cet enfant d'ailleurs trés bien constitué fort gros et vivant; mais etant au monde il expira demy quart d'heure aprés; voulant délivrer la malade et voyant que rien n'obeissoit, malgré les efforts que je faisois sur le cordon; j'introduisis ma main dans la matrice ou je trouvai bien de l'espace, et que l'arrier faix etoit chattonné en totalité dans son fond ou partie superieure; je le sortis de sa capsule et je terminai ainsy l'accouchement. — J'examinai cet arrier faix, il etoit trés solide et comme calleux; il avoit plus d'un pouce d'épaisseur, et cinq de diametre; sa forme parfaitement ronde — réprésentoit une rave applatie; la face qui repondoit au cordon ombilical — etoit un péu cave, il y avoit a toute sa circonference, une impression de prés de deux lignes qui n'etoit point recouverte du chorion, comme le reste de cette face, et qui paroissoit avoir servi a loger le bord de la capsule: ce qui me fit croire que si j'avois continué de faire effort sur le cordon ombilical, qui partoit du centre de cet arrier faix; j'aurois occasionné un rénvérsement complet de la matrice: accident qui peut étre lorsqu'il est arrivé a éu une cause semblable qu'on n'a ni connue ni suspecté.

Il resulte de tout ce dessus que la solidité des menbranes qui envelopent l'enfant dans le sein de sa mere, prolonge le travail de l'accouchement: que cette méme solidité, conjointement avéc le chattonnement du placenta en totalité ou en partie, ou une trop forte adhérence des dites menbranes a ce viscere, — surtout lorsqu'elle se trouve étre plus vérs son fond que vérs son col, peut y — occasionner un rénvérsement complet, et géner les contractions de la matrice; dont le col et l'orifice sont trés relachés et sans action dans l'accouchement; sans quoy ces parties, c'est a dire son fond, son col, et son orifice s'opposeroint une resistance, si non invincible, du moins telle, qu'elle rendroit l'accouchement plus doulouréux et trés dangereux pour les suittes, par les déchirements qui se seroit nécéssairément au col et a l'orifice de la matrice; accidents qui séroint inévitables sans cette sage précaution de la nature.

Vous trouverés peut étre que ces observations sont chargées de details — etrangers; mais je n'ay pas cru dévoir les en dépouiller en entier, dans l'intention ou je suis de les montrer dans la plus grande évidence possible.

Jay l'honneur d'étre avéc Respect

Monsieur

Vôtre trés humble et trés obeissant serviteur Jarry

a Saint andré de cubzac Route de Bord.x
ce 9 Septembre 1786

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

No. 59